

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM		
Título: Cauterização de verruga anogenital		
CONCEITO: Cauterização de verrugas anogenitais causada pelo vírus do HPV.		
Data de implantação: 29/06/2022	Edição: 001	Codificação: 009
Validade: Indeterminada	Revisão: 000	Página: 1 de 2

Responsáveis:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Lucilene Maria Schmitz COREN/SC 112874 Adriana Camargo COREN/SC 301552	Felipe Eduardo de Lima Recart COREN/SC 464.796 Gabriela Marinho Gomes COREN/SC 503.742	Elizimara Ferreira Siqueira COREN/SC 82.888 Responsabilidade Técnica Enfermagem

1. Objetivos:	2. Aplicação:	3. Executante:
Cauterizar verrugas de HPV, a fim de diminuir a transmissão sexual/vertical.	- Unidades Básicas de Saúde - Policlínicas	Enfermeiros e médicos.

4. Material
<ul style="list-style-type: none"> • ATA (ácido tricloroacético 80%) (pode ser usado em gestantes) • Haste com ponta de algodão (palito de dente e/ou “cotonete”) • Lidocaína tópica ou vaselina • Luva de procedimentos • Mesa ou superfície rígida para disposição dos materiais • Lixeira • Sabão neutro, bicarbonato ou talco (pulverizado no local).

5. Descrição do Procedimento/Técnica
<ul style="list-style-type: none"> • Lavar as mãos. • Colocar paciente/usuário em posição que favoreça a cauterização, mantendo sua privacidade. • Proteger a área ao redor da lesão com lidocaína tópica ou vaselina. • Vista as luvas de procedimento. • Com cuidado, retirar ATA do frasco com conta gotas. • Pingar ATA no algodão da ponta do palito ou cotonete de acordo com tamanho da lesão. • Aplicar sobre a verruga mantendo um ângulo de 90 graus em relação à pele, fazendo leve pressão até que a verruga fique com uma coloração branco/acinzentada. • Esperar secar completamente, o que é indicado pelo branqueamento local. • Organizar materiais e ambiente.

6. Orientações gerais

- Na ocorrência de dor na aplicação pode-se neutralizar a ação do ácido com o uso de sabão, bicarbonato de sódio ou talco pulverizado sobre a local.
- Agendar retorno semanal.
- Em geral, 3 aplicações resolvem, mas o tratamento pode ser estendido por até 10 semanas, havendo necessidade, importante ressaltar a taxa de reincidência para tratamento com ATA alcança até 36% nos primeiros 3 meses. Após desaparecimento dos condilomas, não é necessário controle.
- Solicitar sorologias.
- Orientar uso de preservativo em todas relações sexuais.
- Os pacientes devem ser orientados sobre a possibilidade de recorrência, que frequentemente ocorrem nos três primeiros meses.
- Tranquelize o paciente que a maioria das verrugas resolvem espontaneamente em 2 anos.
- Coletar exame citopatológico de colo de útero nas mulheres, conforme critérios de rastreamento de câncer de colo de útero.
- Encaminhar para atenção secundária se:
 - Verrugas com mais de 1cm de diâmetro;
 - Múltiplas lesões complicadas (inflamação importante e/ou infecção no local);
 - Lesões vaginais internas (mucosa) ou colo uterino;
 - Sem melhora após tratamento inicial.
- Nas gestantes, avaliar se o tempo esperado para tratamento encerra antes da data mínima esperada para o parto. Caso contrário, discutir com médico da equipe e encaminhar para atenção secundária, se necessário. Contudo, cabe destacar que a ocorrência por HPV no canal de parto não contraindica o parto por via baixa (vaginal), já que a infecção do feto ocorre normalmente no período intraútero. Apenas as lesões obstrutivas gerariam contra-indicação ao parto vaginal.

7. Referências

- BMJ Best Practice. Verrugas genitais. <http://brasil.bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/228/treatment/details.htm> Acesso em: 12/05/2022.
- GODLEY, M J; BRADBEER, C s; GELLAN, M; THIN, R N. Cryotherapy compared with trichloroacetic acid in treating genital warts. **Sexually Transmitted Infections**, [S.L.], v. 63, n. 6, p. 390-392, 1 dez. 1987. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/sti.63.6.390>.
- Florianópolis-SC. Protocolo de Enfermagem Volume 2, IST Dengue e Tuberculose, SMS Florianópolis. Atualizado em 2020.
- PACK Brasil Adulto: versão Florianópolis. Kit de Cuidados em Atenção Primária. Ferramenta de manejo clínico em Atenção Primária à Saúde. University of Cape Town Lung Institute's Knowledge Translation Unit, 2017. Título original: Practical Approach to Care Kit – PACK Global Adult.
- PARECER COREN-SC. **Parecer 006-2013**. Florianópolis, SC, 01 set. 2013. Disponível em: <http://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/Parecer-006-2013-CT.pdf>. Acesso em: 12 maio 2022.